

Operationsvejledning Polypfjernelse

Operation på: _____ Cpr.: _____ er planlagt til

mødetid 15 min. før planlagt operation

Fjernelse af polypper foregår i fuld bedøvelse under medvirken af narkoselæge og varer ca. 25 min. Operationen foregår ved, at polypperne i næsesvælget skrubes væk. Der kommer herefter et sår, som kan give lettere smerter i halsen og ud til ørerne.

Før operationen:

- Barnet må:
- kun indtage et let måltid indtil kl.
- kun indtage vand, saft eller juice væsker indtil kl.

Havregryn og mælkeprodukter er strengt forbudt at indtage på operationsdagen.

Der må ikke drikkes i forbindelse med tandbørstning. Børn frarådes tandbørstning helt.

Forældrene bedes forhindre at barnet selv skaffer sig mad, drikke, slik el. lign.

Smertestillende medicin før operation:

- | | |
|-----------------|------------------------------|
| Tabl./Flydende: | 2 timer før operationen |
| Stikpille: | lige inden I kører hjemmefra |

Medbring gerne et tæppe til barnet under opvågningen.

Efter operationen:

Hjemtransporten skal enten foregå i privatbil eller med taxa. Ikke til fods, med bus el. lign.
Det tilrådes, at der er 2 voksne med ved hjemtransport i privatbil.

Barnet må spise, når det har lyst. Det tilrådes at spise is og koldt flydende f.eks. yoghurt den første dag. De følgende dage tilrådes lunken og blød kost. Sodavand frarådes grundet kultsyrebobler.

Barnet skal holdes i ro de første dage efter operationen for at undgå blødning, hvis såret springer op.

Barnet skal være under voksenopsyn det første døgn, og en voksen bør sove sammen med barnet den første nat. Barnet skal holdes hjemme fra institution 2-3 dage.

I det første døgn efter operationen, er det ikke unormalt at barnet kaster gammelt blod (brunt) op. Lad barnet sidde op og sutte knust is eller sodavandsis.

Ved opkastning af friskt blod, gives barnet straks rigeligt med knust is. Aftager blødningen ikke efter 5-10 min., skal barnet tilses af en læge. (Kør på skadestuen).

Let feber de første dage er heller ikke unormalt. Såfremt feberen herefter ikke falder, så kontakt os. Hvis der skulle indtræde komplikationer eller ved tvivlstilfælde kan læge Mette Th. Kristensen træffes på klinikken tlf. 64 71 46 47 eller på mobil 21 74 41 15.